



Instituto Nacional
de Salud Pública

Violencia contra las mujeres mexicanas durante la pandemia COVID-19

Presenta

Mtra. Marina Séris Martínez
dra.seris.martinez@gmail.com

Coautores: Leonor Rivera Rivera, Luz Myriam Reynales Shigematsu, José Alberto Gómez García, Fernando Austria Corrales, Filiberto Toledano-Toledano, Diana Iris Tejadilla Orozco, Claudia Iveth Astudillo García.



Introducción

1



La violencia contra las mujeres (VM) es un problema de salud pública y una clara violación de los derechos humanos que afecta la salud física y mental de quienes la padecen.

2



Este problema suele incrementarse en situaciones de crisis sanitaria, económica y social como sucede con la pandemia por COVID-19.

3




Al inicio de la pandemia se reportó incremento en la VM debido a eventos estresantes y cambios en las rutinas cotidianas derivadas de la pandemia.



Introducción

Factores asociados a VM



World Health Organization (2014)
International Rescue Committee (2019)
Marques ES et al (2020)

Estos factores se han exacerbado como resultado del impacto de la pandemia por COVID-19.

Las crisis sanitarias, económicas y sociales= estrés y aumento de las discusiones familiares.

Incremento del trabajo doméstico para la mayoría de las mujeres.

El aumento de la carga familiar provoca una disminución en la capacidad para evitar conflictos con la persona agresora.



Introducción

Situación en México

1

Prevalencia en México → 6%. La mayoría de estas mujeres ya habían sido víctimas de algún tipo de violencia antes del confinamiento.

2

En México, se fortalecieron y difundieron estrategias de atención, observando un incremento en las llamadas telefónicas y en el número de usuarias de los centros de atención de la violencia.

3

A pesar de dichos esfuerzos, no se logró conocer la magnitud de la violencia ni otros factores que influyeron en su incremento durante la pandemia.



Objetivo


Conocer la prevalencia y los factores asociados a la violencia contra las mujeres durante la pandemia por COVID-19 en México.



Métodos




“Atención Psicológica a Distancia para la Salud Mental por la contingencia por COVID-19”

Abril a diciembre del 2020



Resultados

Características de la población general del estudio (%)







Resultados

Variables de la situación de pandemia COVID-19 (%)


Prevalencia de VM: 11.5%





Resultados

Factores asociados a la VM



RM: Razón de Momios.



Conclusiones

A pesar de presentar algunas limitaciones.

01

El desempleo y la carga de ser cuidadora, asociado con la VM nos demuestra la brecha de desigualdad de género.

02

Es necesario realizar protocolos de contingencia para la prevención de este problema en caso de emergencias sanitarias.

03

Se requiere dar continuidad a estudios de este tipo para medir la evolución del fenómeno después de la pandemia.

04



**MUCHAS
GRACIAS**



Instituto Nacional
de Salud Pública



SMA

Salud Mental y Adicciones
Salud Mental y Adicciones

<https://sma.controltabaco.com/>

